



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

Protección de la Niñez
y la Juventud




Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

ESTRATEGIAS PARA MITIGACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. PROGRAMA PILOTO

CAAJJ - IDIPRON

Di. prou

un: Da3
De
mitigation



h

Atención integral y preventiva de niños(as) y adolescentes en conflicto con la ley y/o en situación de vulneración de sus derechos. (Plan de desarrollo 137)

PREVENCIÓN INGRESO A SRPA – GOCE DERECHOS

- NNAJ en riesgo de entrar al SRP
- NNAJ sin medida privativa de la libertad
- NNAJ post medida.

**CENTRO DE ATENCIÓN A
ADOLESCENTES Y JUSTICIA
JUVENIL (CAAJJ)**

- 2.500 NNAJ Atendidos
 - Acompañamiento familiar y comunitario
 - Asesoría legal
 - Valoración psicosocial
 - Alimentación
 - Pedagogía : Talleres ocupacionales y artísticos
 - Unidad de Mitigación de consumo de SPA
- Proyecto de Vida
- Fortalecimiento de capacidades para la convivencia

CENTRO DE ATENCIÓN A
ADOLESCENTES Y JUSTICIA
JUVENIL (CAAJJ)

UNIDAD DE MITIGACIÓN

Medicina occidental + Medicina Alternativa

- Valoración y tratamiento integral
- NNAJ con riesgo alto y moderado de consumo de SPA y/o factores de riesgo para vulneración de derechos.

- Control de estados emocionales y ansiedad que conducen al consumo de SPA
- Mitigar el consumo de SPA – Consumo responsable no problemático

Disminución de Frecuencia – Dosis – Sustancias consumidas

OBJETIVOS UMA



ACUPUNTURA



ELECTROTERRAPIA



AURICULOTERAPIA



OSTEOPATÍA CRANEOSACRA

OBJETIVO INTERVENCIÓN

- Reducir los síntomas de síndromes de abstinencia
- Reducir el consumo de SPA de manera temprana
- Disminuir el uso de terapias de sustitución o psicofármacos
- Facilitar la adherencia o continuidad del paciente a los diversos programas integrales de tratamiento.
- Disminuir la tasa de recaídas tempranas (6-12 m) y de abandonos

PILOTO

Periodo analizado: 23 Enero
2014 – 31 Enero 2015

- 13 Unidades de IDIPRON
- Intervención con MA:
 - Acupuntura – Electroterapia
 - Auriculoterapia
 - Osteopatía Craneosácrca
- Sesión: 1 vez/semana – 30 min


*frente archivo historias clinicas
unidad mitigacion CAAJ*

RESULTADOS

- Prueba piloto
- El universo fue el 100% de la población asistente al CAAJJ que presento adherencia al programa.
- La fuente de la información son las historias clínicas que reposan en el archivo del CAAJJ.

fuelle archivo historias clínicas
unidad mitigacion CAAJJ

RESULTADOS




TOTALES

TOTAL JOVENES ATENDIDOS 395

SESIONES 1770

PROMEDIO SESIONES: 4

TOTAL ADHERIDOS




Adherencia asistencia a mas de tres sesiones

Total NNAJ
Atendidos
y Sesiones

DISTRIBUCION POR SEXO


- MASCULINO
- FEMENINO
- INDETERMINADO



DISTRIBUCION
POR SEXO

fuelle archivo historias clinicas unidad
mitigacion CAAJ

GRUPOS DE EDAD




fuelle archivo historias clinicas unidad
mitigacion CAAJJ

10 A 28 AÑOS
PROMEDIO EDAD 17

55% 18,3%

NUMERO DE SESIONES POR NNAJ




fuelle archivo historias clinicas
unidad mitigacion CAAJJ

Rango de 4 a 25 sesiones promedio 9 sesiones


TIPO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONSUMIDAS POR NNAJ

CONSUMO INICIAL POR SUSTANCIA




VARIACION EN EL CONSUMO POR TIPO DE PSA

■ CONSUMO INICIAL ■ CONSUMO FINAL




COMPARATIVO NUMERO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS



fuelle archivo historias clinicas
unidad mitigacion CAAJJ

VARIACION NUMERO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS


VARIACION NUMERO SUSTANCIAS CONSUMIDAS



fuelle archivo historias clinicas
unidad mitigacion CAAJJ


**VARIACIÓN DE
FRECUENCIAS DE
CONSUMO**

CONSUMO DE CANNABIS





CONSUMO DE CIGARRILLO

Frecuencia de Consumo




BEBIDAS ALCOHOLICAS






DERIVADOS DE
COCAINA
(BAZUCCO)

DERIVADOS DE COCAINA (PERICO)




INHALANTES O DISOLVENTES




fuentes archivo historias clinicas unidad mitigacion CAAJJ

ALUCINOGENOS (ACIDOS)



fuelle archivo historias clinicas unidad mitigacion CAAJJ

TRANQUILIZANTES



CONCLUSIONES

- La sustancia de mayor consumo entre NNAJ que asisten a la UMA es la marihuana, seguida del cigarrillo y el alcohol.
- Consumo de pegante en menores de edad.
- Consumo alcohol y su relación con consumo de pepas y perico
- Consumo de cigarrillo acompaña otras como el bazuco, o reemplaza el consumo de otras sustancias como la marihuana.
- Componente psicosocial como disparador de recaídas

- Apatía inicial - adherencia mayor en curso del proceso
- Poca fidelidad de datos de consumo inicial. (VESPA)
- Desinformación inicial .
- Falta conciencia de daños secundarios a consumo.
- Recaídas y reinicio de proceso.

CONCLUSIONES

LIMITACIONES

- Alta rotación de pacientes
- Falta de adherencia
- Dosificación de sustancias no estandarizada

TESTIMONIOS

